

## Изотопный состав углерода доминирующих растений на грубогумусных буроземах Витимского плоскогорья

Егорова Р.А.

*Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН*

Стабильные изотопы являются полезным инструментом для исследований в области физиологии растений и экологии, поскольку изотопное фракционирование в растениях происходит во время фотосинтеза и транспирации - основных физиологических процессов, ответственных за их рост.

Изотопный состав углерода растений был определен в хвое, ветках, корнях и коре *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr.; листьях, ветках, корнях и коре *Betula platyphylla* Sukaczew; листьях, ветках и корнях *Rhododendron dauricum* L.; листьях, стеблях и корнях *Vaccinium vitis-idaea* L., *Lathyrus humilis* (Ser.) Sprengel, *Pyrola asarifolia* Michaux, *Festuca* L.; листьях и корнях *Carex pediformis* С.А. Meyer.

На грубогумусных буроземах растения относятся к С-3 типу фотосинтеза. У представителей бобовых, разнотравья и полукустарниковых (*Lathyrus humilis* (Ser.) Sprengel, *Pyrola asarifolia* Michaux и *Vaccinium vitis-idaea* L.) надземные части обеднены  $^{13}\text{C}$  по сравнению с подземными на 0,25; 0,48 и 0,23 ‰ соответственно. У *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. ветки и хвоя различаются незначительно, так же как ветки и листья *Betula platyphylla* Sukaczew. Накопление тяжелого изотопа углерода происходит в коре, наружная часть которой состоит в основном из мертвых тканей и поэтому физиологически неактивна. Кора *Betula platyphylla* Sukaczew обогащена  $^{13}\text{C}$  по сравнению с листьями на 2,24 ‰, а *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. – на 3,55 ‰.

Надземная масса *Festuca* L., по сравнению с корнями, обогащена тяжелым изотопом на 0,82 ‰. Возможно, такое распределение изотопов углерода связано с большим содержанием в корнях лигнина, который, как правило, обеднен на 1-4 ‰ по сравнению с цельным органическим материалом (Olsson et al. 1972, Leavitt and Long 1982, Badeck et al. 2005).

У *Carex pediformis* С.А. Meyer различия в изотопном составе углерода листьев и вегетативных органов не выявлены. У кустарника *Rhododendron dauricum* L. напротив, утяжеление  $^{13}\text{C}$  происходит от корней к листьям и различие в сдвиге градиента составляет 3,11 ‰. Вероятно, такой изотопный рисунок надземной и подземной частей *Rhododendron dauricum* L. обусловлен тем, что его молодые побеги и листья содержат до 0,1 – 0,15 % эфирного масла и в жаркую погоду активно его выделяют. Из литературы известно, что такие процессы как поглощение аминокислот из почвы, выделение органических кислот корнями, выброс летучих органических соединений и т.д. могут потенциально влиять на селективную потерю или обогащение  $^{13}\text{C}$  (Lucas A. et al., 2009).

Изотопный состав углерода бобовых (*Trifolium lupinaster* L.) и злаковых (*Leymus chinensis* (Trin.) Tzvelev) разнотравно-злакового луга на лугово-черноземных мерзлотных почвах тяжелее бобовых (*Lathyrus humilis* (Ser.) Sprengel) и злаковых (*Festuca* L.), произрастающих на буроземах: разница в сдвиге градиента составляет в корнях 1,16; стеблях 0,18; листьях 0,23 ‰ и 2,45; 2,12 и 1,15 ‰ соответственно. Надземная масса лугового разнотравья (*Galium verum* L.), наоборот, легче лесного (*Pyrola asarifolia* Michaux) на 1,59, а подземная - на 1,12 ‰.

Возможно, такие различия в изотопном составе растений одного семейства связаны с факторами окружающей среды, которые воздействуют на изотопный состав углерода растений, главным образом через соотношение  $\text{C}_i/\text{C}_a$  ( $\text{C}_i$  – концентрация  $\text{CO}_2$  внутри листа;  $\text{C}_a$  – концентрация  $\text{CO}_2$  в воздухе) и могут быть причиной как обогащения, так и обеднения изотопом  $^{13}\text{C}$ . Например, повторная ассимиляция выдыхаемого  $\text{CO}_2$ , сокращение освещенности под очень густым и закрытым пологом леса или сокращение содержания питательных веществ в почве ведут к обеднению изотопом  $^{13}\text{C}$ . Противоположный эффект наблюдается при увеличении “водного стресса” (при ухудшении влагообеспеченности) или уменьшении парциального давления  $\text{CO}_2$ . Все растения уменьшают поглощение  $\text{CO}_2$  при температурах ниже оптимальных, и это обуславливает увеличение отношения  $\text{C}_i/\text{C}_a$ , уменьшая значения  $\delta^{13}\text{C}$  (Levitt and Danzen, 1992; Levitt and Long, 1991; Smith et al., 1976; Stuiver and Broziunas, 1987; Van Klinken et al., 1994; Winter et al., 1982).